

# SIROFOP EC<sup>®</sup>

Concentrado Emulsionable (EC)

## HERBICIDA SELECTIVO DE TRIGO Y CEBADA.

**COMPOSICIÓN:** Diclofop (éster metílico) 36% p/v (360 g/l) EC

### CARACTERÍSTICAS

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC: **1A**

**SIROFOP EC<sup>®</sup>** es un herbicida selectivo de trigo y cebada.

Actúa por contacto y traslocación, específicamente eficaz contra avena loca (*Avena spp.*), vallico (*Lolium spp.*) y alpiste (*Phalaris spp.*).

### USOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Uso	Agente	Dosis (L/ha)	No. Aplic.	Intervalo (Días)	Caldo (L/ha)	Forma y época de aplicación	Plazo de seguridad
Trigo y Cebada	Avena loca ( <i>Avena spp.</i> ), Vallico ( <i>Lolium spp.</i> ) y Alpiste ( <i>Phalaris spp.</i> ).	1.6	--	--	--	Aplicar en pulverización normal a baja presión en postemergencia del cultivo cuando las gramíneas invasoras se encuentran en el estado de 2-4 hojas, salvo en el caso de <i>Phalaris paradoxa</i> (alpiste fino) que se muestra resistente con más de 2 hojas. El estado de desarrollo del cultivo no es limitativo, pero en ningún caso debe estar tan desarrollado que cubra a las malas hierbas. En cebada, el tratamiento debe suspenderse antes de que el cultivo alcance la segunda mitad del ahijamiento y en trigos antes de fin del ahijamiento. La actividad herbicida de <b>SIROFOP EC<sup>®</sup></b> no se ve afectada por una lluvia que pueda sobrevenir unas horas después del tratamiento y su efecto sobre las gramíneas invasoras es tanto más rápido y completo cuando las hierbas se encuentran en condiciones de crecimiento más activo. El efecto del tratamiento suele ser visible a partir de los 10-15 días de su aplicación en líneas generales. La paja no podrá ser utilizada como alimentación del ganado.	No procede

### PRECAUCIONES

- Antes de aplicar en cebadas de dos carreras y en variedades de trigo que se introducen por primera vez en España, consultar con su distribuidor habitual
- Los herbicidas hormonales deben aplicarse 8-10 días después del tratamiento con **SIROFOP EC<sup>®</sup>**.
- No aplicar en condiciones extremas de sequedad y frío.

### OBSERVACIONES

- De uso exclusivo para los usos y condiciones indicados en esta etiqueta.
- Quien use el producto es responsable de los eventuales daños que pueden derivarse de un uso inapropiado del preparado.
- El cumplimiento de todas las indicaciones es indispensable para asegurar la eficacia del tratamiento y para evitar daños en plantas, personas y animales.
- Para evitar riesgos en el hombre y el medio ambiente seguir las instrucciones de uso.
- No contaminar otros cultivos, alimentos, bebidas y cursos de agua.
- No aplicar con viento.
- El preparado no se usará en combinación con otros productos.

### NOTA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).

La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

I.R.O.P. y M.F. con el nº 24.256

Titular y fabricante: PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.U

© Producto y Marca registrada de PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.U



ENVASES: